آتورواستاتین ۲۰ Atorvastatin 20

ترکیبات: آتورواستاتین (بصورت کلسیم تری هیدرات) ۲۰ میلی گرم
دسته دارویی: مهار کننده آنزیم HMG-CoA Reductase، آنتی هایپرلیپیدمی (کاهنده چربی خون)
موارد مصرف: کاهش کلسترول تام، LDL- C، آپولیپو پروتئین B و تری گلیسرید در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی، پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلب، کاهش خطر سکته قلبی، مغزی و آژین.

هشدارها:
•قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
✓ در صورت سابقه حساسیت به این دارو و یا لوواستاتین، سیمواستاتین، فلوواستاتین، پراواستاتین و همچنین حساسیت به هر نوع غذا، ماده محافظ، ماده رنگی.
✓ در صورت مصرف همزمان با داروهای سیکلوسپورین، فیبرات ها، جم فیبروزیل، نیاسین، داروهای ضد بارداری، دیگوگسین، نفازودون، وراپامیل.
✓ در صورت سابقه دریافت پیوند عضو و یا مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، ابتلا به نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی، عفونت حاد، اختلالات الکترولیتی و متابولیکی شدید، افت فشار خون، صرع کنترل نشده، جراحی یا آسیب های جدی.
✓ در صورت بارداری یا شیردهی به پزشک اطلاع دهید.
•دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید. •در صورت فراموش کردن مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید اما اگر زمان مصرف دوز بعدی نزدیک بود از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمایید. •از مصرف همزمان آتورواستاتین با آب گریپ فروت خودداری نمایید. •قبل از قطع مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید. •در افراد با سابقه بیماری های کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف گردد. •آزمایش‌های عملکرد کبد باید قبل از شروع درمان و پس از آن به صورت دوره‌ای انجام شود. بیمارانی که سطح ترانس‌آمینازهای آنها افزایش یافته است، باید تا زمان رفع آن تحت نظر پزشک باشند. در صورت تداوم افزایش ترانس‌آمینازها بیش از ۳ برابر حد بالای نرمال(ULN)، کاهش دوز یا قطع آتورواستاتین توصیه می‌شود.•در صورت هر نوع جراحی (از جمله جراحی های دهان و دندان) یا درمان های اورژانسی به پزشک اطلاع دهید. •در طول درمان باید بیمار از نظر کلسترول، کراتین کیناز، تست های کبدی و ترانس آمیناز ارزیابی گردد. •از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری نمایید همچنین در زنانی که دارای پتانسیل باروری هستند لازم است که در طول مصرف دارو از روش‌های مناسب برای پیشگیری از بارداری استفاده نمایند. •از مصرف همزمان آتورواستاتین با فرم خوراکی یا تزریقی فوزیدیک اسید خودداری نمایید همچنین مصرف آن باید حداقل ۷ روز با قطع مصرف فوزیدیک اسید فاصله داشته باشد. در بیمارانی که مصرف فوزیدیک اسید خوراکی یا تزریقی برای آن‌ها ضروری تشخیص داده شده است، درمان با استاتین باید در تمام طول دوره درمان با اسید فوزیدیک متوقف شود. درمان با استاتین را هفت روز پس از مصرف آخرین دوز اسید فوزیدیک می توان شروع کرد. •در بیمارانی که داروهای ضد ویروس هپاتیت C شامل الباسویر/گرازیروبر (elbasvir/grazoprevir) را همزمان با آتورواستاتین مصرف می‌کنند، دوز آتورواستاتین نباید از ۲۰ میلی‌گرم در روز تجاوز کند.

مقدار و نحوه مصرف:
مقدار دقیق مصرف دارو توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار و سطح پایه LDL-C تعیین می گردد. اما به طور معمول دوز شروع ۱۰ میلی‌گرم یک‌بار در روز است. تنظیم دوز باید در فواصل زمانی ۴ هفته‌ای یا بیشتر انجام شود. حداکثر دوز مجاز مصرف، ۸۰ میلی‌گرم یک‌بار در روز است. دارو را می توانید همراه با غذا یا بدون آن مصرف نمایید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱
تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+)
صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com
TAB.LFT.ATV20_03

(Page 1)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
از مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی خودداری نمایید.

عوارض جانبی:
هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز شود اگر چه در اغلب بیماران عارضه چندانی بروز نکرده و یا عوارض جزئی با ادامه درمان بر طرف می شود لذا در صورت بروز هر کدام از این عوارض و ادامه یا تشدید آن ها با پزشک مشورت نمایید.
عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:
•**نادر:** میالژی، میوزیت، رابدومیولیز (تب، درد یا گرفتگی عضلانی، ضعف)
عوارضی که در صورت تداوم یا ادامه یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:
•**شایع:** یبوست، اسهال، سوزش سردل، درد معده، سرگیجه، سردرد، تهوع، راش پوستی
•**نادر:** بی خوابی، ناتوانی جنسی

موارد منع مصرف:
•در صورت حساسیت به آتورواستاتین یا هر یک از اجزای فرآورده •ابتلا به بیماری فعال کبدی یا افزایش پایدار و توجیه نشده سطح ترانس آمینازهای سرمی به میزان بیش از ۳ برابر حد بالای نرمال •بیمارانی که با داروهای ضدویروس هپاتیت C شامل گلکاپرویر/ پیبرنتاسویر (glecaprevir/pibrentasvir)، تحت درمان هستند. •دوران بارداری و شیردهی

تداخلات:
•داروهایی که ممکن است غلظت پلاسمایی آتورواستاتین و خطر بروز رابدومیولیز را افزایش می دهند: مهار کننده‌های قوی آنزیم CYP3A4 یا مهار کننده‌های پروتئین‌های ناقل (مانند سیکلوسپورین، تلیترومایسین، کلاریترومایسین، دلاویردین، استیریپنتول، کتوکونازول، وریکونازول، ایتراکونازول، پوساکونازول، لترمووبر و مهار کننده‌های پروتئاز HIV از جمله ریتوناویر، لوپیناویر، آتازاناویر، ایندیناویر، دارونایر، تیپراناویر/ ریتوناویر. •در صورت مصرف داروهای مهار کننده‌ی قوی CYP3A4، باید دوز شروع پایین‌تری برای آتورواستاتین در نظر گرفته شود همچنین در طول درمان بیمار متناوباً توسط پزشک ارزیابی بالینی گردد.•همچنین با مصرف همزمان این دارو با جم‌فیبروزیل و سایر مشتقات اسید فیبریک، داروهای ضد ویروس برای درمان هپاتیت Cمانند بوسپرویر، تلاپرویر، الباسویر/گرازپرویر، لدیپاسویر/سوفوسبویر، ایتروماپسین، نیاسین یا ارتیمایب ممکن است خطر بروز میوپاتی افزایش یابد. •مصرف همزمان با داپتومایسین ممکن است خطر بروز میوپاتی و یا رابدومیولیز را افزایش دهد. در مورد بیمارانی که داپتومایسین مصرف می‌کنند، باید قطع موقت مصرف آتورواستاتین مد نظر قرار گیرد، مگر آنکه مزایای مصرف همزمان بر خطرات آن ارجحیت داشته باشد. اگر امکان اجتناب از مصرف همزمان وجود ندارد، باید سطح کراتین‌کیناز، ۲ تا ۳ بار در هفته اندازه‌گیری شود و بیمار از نظر بروز هرگونه علامتی که حاکی از میوپاتی باشد، تحت پایش قرار گیرد.

شرایط نگهداری:
دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:
شرکت داروسازی رها قرص آتورواستاتین ۲۰ را به صورت بلیستر و درون جعبه عرضه می نماید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱
تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+)
صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com
TAB.LFT.ATV20_03

(Page 2)