شـــرکت داروسازی رهـــا
RAHA Pharmaceutical Co.

کلیناواگ®۲ درصد
کلیندامایسین

Clinavag®2%
Clindamycin

ترکیبات: کلیندامایسین (بصورت فسفات) ۲ گرم در هر ۱۰۰ گرم کرم

شکل دارویی : کرم واژینال

موارد مصرف : واژینوز باکتریایی

راهنمایی‌های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در مورد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت سابقه حساسیت به کلیندامایسین یا لینکومایسین .

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی :

مصرف دارو در سه ماهه دوم و سوم حاملگی مجاز می باشد، ولی در سه ماهه اول مطالعات کافی وجود نداشته و تنها در صورت نیاز با توصیه پزشک قابل استفاده است. مصرف این دارو در دوران شیر دهی تنها با توصیه پزشک مجاز می باشد.

هشدارها :

- دوره درمان را حتی در صورت کاهش و یا از بین رفتن علائم بیماری کامل کنید. در غیر این صورت امکان عود بیماری وجود دارد.
- از تماس دارو با اطراف چشم جلوگیری نمایید.
- در طول درمان با این دارو از انجام مقاربت خودداری شود.
- مصرف این کرم ممکن است محیط واژن را برای رشد میکرو ارگانیسم های غیر مستعد واژن، بویژه قارچ ها همچون کاندیدا آلبیکانس مناسب نماید.
- تا ۷۲ ساعت بعد از تکمیل درمان استفاده از کاندوم، سرویکال کاپ یا دیافراگم توصیه نمی شود.
- بعد از ماه ششم حاملگی اپلیکاتورهای واژینال با احتیاط بکار رود.
- در طول عادت ماهیانه درمان را قطع نکنید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۰۳۱(۹۸+) www.rahapharm.com

(Page 1)

شـــرکت داروسازی رهـــا
RAHA Pharmaceutical Co.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است :

درمان عفونتهای باکتریال واژن :

مقدار یک اپلیکاتور از کرم (۵ گرم از کرم که حاوی ۱۰۰ میلی گرم کلیندامایسین می باشد) را روزی یکبار و ترجیحاً به هنگام خواب استعمال نمایید.

طول مدت درمان در خانم های غیر بار دار ۷ – ۳ روز و در خانمهای باردار در سه ماهه دوم و سوم بارداری ۷ روز می باشد.

قبل از مصرف دستها را شسته و اپلیکاتور را در حالت دراز کشیده وارد واژن نموده و به آهستگی محتویات آن را به داخل واژن فشار دهید .

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض ذیل با پزشک مشورت نمائید:

عوارض شایع : خارش و قرمزی دهانه رحم، درد در هنگام مقاربت، ترشحات سفید رنگ

عوارض نادر : سر درد، سر گیجه، منگی، تهوع و استفراغ، درد شکمی، حساسیت،گر گرفتگی، خارش، بثورات جلدی، التهاب واژن و سرویسیت ناشی از رشد کاندیدا آلبیکانس

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها کلیندامایسین را به صورت کرم واژینال ۲ درصد با نام تجاری کلیناواگ® در تیوب های۴۰ گرمی تهیه و درون جعبه به بازار عرضه می‌نماید.

SES.LFT.CLV2/016.05

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۰۳۱(۹۸+) www.rahapharm.com

(Page 2)