

Ibuprofen 100 mg/5 ml

ایبوپروفن ۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

دسته دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی

موارد مصرف و آثار درمانی: ضد درد و تب، ضد التهاب

راهنمایهای عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی یا ماده محافظ.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: اختلالات خونی، آسم، کولیت، نارسایی کلیه، کبد، کم خونی، تیش قلب، فشار خون، پورفیریا، ورم قوزک پا، حملات قلبی، لخته های خونی، زخم معده، ادم و لوپوس.
- در صورت مصرف هر گونه دارو از جمله سایتمیدین، پرونیسید، سالیسیلات ها، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد فشار خون، داروهای محرک مغزی، سدیم والپروات، پنی سیلامین.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

این دارو در گروه **C** از طبقه بندی **FDA** قرار دارد و در بارداری پس از هفته ۳۰م در گروه **D** قرار دارد. مصرف ایبوپروفن در ۳ ماهه آخر بارداری باعث آسیب به جنین می شود. لذا فقط با تجویز پزشک و یا در نظر گرفتن عوارض (ریسک بسته شدن داکتوس آرتریوزوس) مصرف شود. به دلیل ترشح این دارو در شیر، مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها :

- همانند دیگر مسکن ها (NSAIDs)، ایبوپروفن نیز می تواند علائم عفونت را مخفی نماید.
- از استفاده همزمان ایبوپروفن با دیگر مسکن هایی (NSAIDs) که سیکلو اکسیژناز II را مهار می کنند (از جمله سلکوکسیب، مفنامیک اسید و ناپروکسن)، بهتر است پرهیز گردد تا از خطر خونریزی دستگاه گوارش کاسته شود.
- مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی شود.
- از مصرف همزمان با الکل یا فرآورده های دارویی حاوی الکل پرهیز نمایید.
- در کودکان کمتر از ۶ ماه در صورتی که علائم بیماری پس از گذشت ۲۴ ساعت بهبود پیدا نکرد ، با پزشک خود مشورت کنید.
- در کودکان بیش از ۶ ماه در صورتی که علائم بیماری پس از گذشت ۳ روز بهبود پیدا نکرد ، با پزشک خود مشورت کنید.
- در افراد مبتلا به بیماری لوپوس و سایر بیماری های ترکیبی یافت همبند، بهتر است با احتیاط مصرف شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

- مقدار مصرف دارو برای هر بیمار را پزشک تعیین می کند، بهتر است این دارو همراه یا بعد از غذا و همراه با یک لیوان پر از آب میل شود.

مقدار مصرف بر اساس سن:

- نوزادان ۳ تا ۶ ماه بیش از ۵ کیلوگرم: ۲/۵ میلی لیتر - ۳ بار در روز
- مصرف در کودکان ۳ تا ۱۲ سال : بهتر است بر اساس وزن باشد. ۲۰-۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم در هر روز و به صورت منقسم (هر ۶-۸ ساعت) مصرف شود.

- نوزادان ۶ تا ۱۲ ماه : ۲/۵ میلی لیتر - ۳ تا ۴ بار در روز
 - کودکان ۱ تا ۳ سال : ۵ میلی لیتر - ۳ بار در روز
 - کودکان ۴ تا ۶ سال: ۷/۵ میلی لیتر- ۳ بار در روز
 - کودکان ۷ تا ۹ سال: ۱۰ میلی لیتر- ۳ بار در روز
 - کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال: ۱۵ میلی لیتر - ۲ بار در روز
- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۵ کیلو گرم یا ۳ تا ۱ ماه توصیه نمی شود.
ایبوپروفن کم ریسک ترین داروی ضد درد غیر استروئیدی می باشد.
در افراد دچار نارسایی کبدی و کلیوی، مقدار دوز مصرفی بایستی توسط پزشک تعیین گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتند، اما در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک خود مشورت کنید: ناراحتی های گوارشی، زخم معده، خونریزی معده، تهوع، استفراغ، اسهال، نفخ، بیوست، دردهای شکمی، تشدید کولیت و بیماری کرون، راش، ادم، سرگیجه، سردرد و خستگی ، سندرم استیونس - جانسون و سایر واکنش های پوستی مانند TEN.
عوارض جانبی گوارشی و قلبی عروقی ایبوپروفن با مصرف دوز پایین و در کوتاه مدت کاهش یافته و قابل کنترل می گردد.

تداخلات دارویی:

این دارو تداخلات دارویی بسیاری دارد که با مصرف دوزهای بالا، اثرات خود را بیشتر نمایان می کند؛ لذا با پزشک و داروساز خود در مورد ادامه مصرف این دارو مشورت نمائید، تداخلات این دارو بدین شرح است: فورزماید، هیدروکلروتیازید، تریامترن، آسپیرین، وارفارین، تیکلوپیدین، کاپتوپریل، آنتولول، لوآرتان، دیگوکسین، متوترکسات، لیتیم، کلیه کورتیکواستروئیدها، زیدوودین، تاکرولیموس، سیکلوسپورین، سیپروفلوکساسین، میفیریستون، گولستیرامین و فلوکونازول.

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به ایبوپروفن یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن.
- سابقه واکنش های حساسیتی مثل آسم، کهیر، آنژیو ادم، رینیت بعد از مصرف ایبوپروفن، آسپیرین و یا دیگر مسکن ها (NSAIDs).
- سابقه خونریزی دستگاه گوارش یا سوراخ شدگی دستگاه گوارش (perforation) به دلیل مصرف بی رویه و خودسرانه مسکن ها (NSAIDs).
- سابقه زخم معده و یا داشتن زخم معده فعال
- در افراد با نارسایی قلبی کلاس چهار، نارسایی کبدی و کلیوی
- در ۳ ماهه سوم بارداری.

مسمومیت دارویی :

در صورت بروز مسمومیت، بیمار را وادار به استفراغ کرده و هرچه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها سوسپانسیون ایبوپروفن را در شیشه ۱۲۰ میلی لیتر بسته بندی کرده و به بازار عرضه می نماید.