



عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد اما در صورت بروز هر یک از عوارض با پزشک خود مشاوره نمایید:

- **عوارض شایع:** تحریک پذیری، هیجان زدگی (در بزرگسالان)، عصبانیت
- **عوارض غیر شایع:** التهاب مثانه
- **عوارض نادر:** افزایش وزن، برانگیختگی و تحریک سیستم اعصاب مرکزی بویژه در کودکان و سالمندان
- **عوارض خیلی نادر:** سندروم استیونز جانسون
- **سایر عوارض:** اختلال در خواب، مشکلات کبدی، خشکی دهان، احتباس ادرار، گیجی، افت فشار، تاری دید

در افراد سالمند احتمال بروز عوارض بیشتر است.

در پی شروع مصرف این دارو احتمال بروز خواب آلودگی در برخی افراد وجود دارد که پس از چند روز مصرف، این عارضه کاهش می یابد.

موارد منع مصرف:

- حساسیت به کتوتیفن یا هر یک از اجزای فرمولاسیون
- ابتلا به پورفیری حاد
- ابتلا به اختلالات کبدی شدید

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از حد دارو سریعاً به بیمارستان مراجعه نمایید.

تداخلات:

داروهای ضد دایات خوراکی، داروهای خواب آور، داروهای ضد استرس (آرامبخش) و سایر آنتی هیستامین ها.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی: شرکت داروسازی رها قرص کتوتیفن ۱ را در پلیستر و درون جعبه عرضه می نماید.

www.rahapharm.com

TAB_LFT_KTN.03

اصفهان، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱
تلفن: ۰۲۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۲۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(+۹۸)

اصفهان، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱
تلفن: ۰۲۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۲۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(+۹۸)



Ketotifen 1

کتوتیفن ۱

ترکیبات: کتوتیفن فومارات

شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرمی

دسته دارویی: آنتی هیستامین (نسل دوم)، برونکودیلاتور و ضد آسم

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان آلرژی از جمله رینیت، کونژکتیویت، پیشگیری آسم

هشدارها:

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید. • قبل از شروع مصرف دارو در صورت وجود هر یک از موارد زیر، با پزشک خود مشورت نمایید: ✓ بارداری یا شیردهی ✓ سابقه حساسیت به دارو، هر نوع غذا و یا ماده افزودنی ✓ مصرف هر گونه دارو ✓ ابتلا به هرگونه بیماری بویژه دیابت یا صرع • این دارو در درمان حملات آسم کاربرد ندارد و فقط جهت پیشگیری از آسم موثر است. • از مصرف همزمان با داروهای ضد دیابت خوراکی، الکل، آنتی هیستامین، داروهای خواب آور و آرامبخش خودداری نمایید. • در صورت ابتلا به هایپرتروفی پروستات، احتباس ادرار، انسداد گوارشی، تشنج و یا گلوکوم زاویه بسته، دارو باید با احتیاط فراوان و تحت نظر پزشک مصرف گردد. • در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف نمایید اما در صورت نزدیک بودن زمان مصرف نوبت بعدی، نوبت فراموش شده را مصرف نکنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید. • مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی گردد لذا در طول مصرف از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری نمایید. • در پی مصرف کتوتیفن گاهی به علت تحریک سیستم عصبی مرکزی، هیجان زدگی و بی خوابی بویژه در کودکان دیده می شود. • در پی مصرف این دارو به ندرت در برخی افراد احتمال بروز واکنش های ازدیاد حساسیت از جمله آلرژی پوستی شدید وجود دارد که در این صورت مصرف دارو باید قطع گردد و به پزشک خود اطلاع دهید.

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می نماید، با این وجود مقدار مصرف معمول دارو به صورت زیر می باشد:

افراد بزرگسال و کودکان بالای ۳ سال: یک قرص دو بار در روز (صبح و عصر).

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی گردد.

www.rahapharm.com

TAB_LFT_KTN.03

اصفهان، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱
تلفن: ۰۲۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۲۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(+۹۸)

اصفهان، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه، واحد ۱۱
تلفن: ۰۲۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(+۹۸) فکس: ۰۲۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(+۹۸)