

Parkisol® 0.18 Pramipexole

پارکیسول® ۰/۱۸ پرامی پکسول

شکل دارویی: قرص

ترکیبات: پرامی پکسول دی هیدروکلراید مونوهیدرات

دسته دارویی: آگونیست دوپامین (ضد پارکینسون)

موارد مصرف و آثار درمانی: پارکینسون، سندروم پای بی قرار

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱- در صورت سابقه حساسیت به این دارو

۲- در صورت مصرف هر نوع دارو خصوصاً:

• ترکیبات لوودوپا و کربی دوپا

• سایمتیدین

• انتاگونیست دوپامین مانند هالوپریدول، متوکلوپرامید، فتوتیازینها و تیوگزانتینها

• داروهایی که دفع کلیوی دارند مانند دیلتیازم، کینیدین، کینین، رانیتیدین، وراپامیل، تریامترن.

۳- در صورت ابتلا به بیماریهای کلیوی (نارسائی کلیه)، بیماریهای دژنراتیو شبکه چشم، عوارض فیبروتیک ناشی از داروهای دوپامینرژیک.

مصرف در دوران بارداری و شیر دهی:

این دارو در گروه C از طبقه بندی FDA قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری و شیر دهی بایستی در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک انجام شود.

هشدارها:

• جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.

• مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه، مشکلات بینایی، ضعف، احساس سبکی سر و عدم هماهنگی در ماهیچه‌ها شود، لذا از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت کافی دارند خودداری کنید.

• مصرف این دارو در بیماران مسن که مستعد بیماریهای کلیوی هستند، با احتیاط صورت گیرد.

• ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان ثابت نشده است. لذا نباید در گروه سنی زیر ۱۲ سال مصرف شود.

• در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن در صورتیکه نزدیک مصرف دوز بعدی نباشد آن را میل کرده و از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری کنید.

عوارض جانبی:

این دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه پزشکی داشته باشند.

خواب آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی در سر، اختلالات بینایی (دوبینی)، افت فشار خون و بی خوابی، ورم، درد عضلانی یا مفصلی، تکرر ادرار، عفونت ادرار، سوءظن تهوع، توهم خصوصاً در افراد مسن، تب، پنومونی، درد قفسه سینه، بلع دردناک، فراموشی.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار دقیق مصرف دارو توسط پزشک و بر اساس شرایط بیمار تعیین میگردد، اما بطور معمول نحوه مصرف این دارو در بزرگسالان بدین صورت می باشد:

• پارکینسون: به صورت ۳ بار در روز

• سندروم پای بی قرار: به صورت یک بار در روز ۲ الی ۳ ساعت قبل از خواب

دارو را می‌توانید همراه غذا یا بدون غذا مصرف نمایید. در صورت بروز مشکلات گوارشی یا تحریک معده دارو را همراه غذا و با معده ی پر مصرف نمایید.

جهت پیشگیری از بروز عوارض جانبی، مصرف این دارو باید با کمترین دوز آغاز گردد و سپس به تدریج دوز مصرفی افزایش یابد.

از قطع مصرف ناگهانی و بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید. مصرف این دارو باید با کاهش دوز تدریجی و تحت نظر پزشک قطع گردد.

سمومیت دارویی:

فوراً بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها پرامی پکسول را با نام تجاری پارکیسول® ۰/۱۸ به شکل قرص بصورت بلیستر و درون جعبه به بازار عرضه می نماید.