پروفام- اچ® ۲،۵/۶،۲۵ ، ۵/۶،۲۵ ، ۱۰/۶،۲۵

Profum-H® 2.5/ 6.25, 5/ 6.25, 10/ 6.25

بیزوپرولول/هیدروکلروتیازید

Bisoprolol/ Hydrochlorothiazide

ترکیبات: بیزوپرولول فومارات و هیدروکلروتیازید

شکل دارویی: قرص روکشدار خط دار

دسته درمانی: کاهنده ی فشارخون (بتابلاکر، دیورتیک تیازیدی)

موارد مصرف: کنترل فشار خون

راهنمایی های عمومی: این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید: وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، ابتلا به بیماریهای دیگر، استفاده از سایر داروها

هشدارها:

• این دارو میتواند باعث بروز واکنش های ازدیاد حساسیت خصوصاً در افراد با سابقه ی آلرژی یا آسم گردد. لذا در افراد با سابقه ی واکنشهای آنافیلاکتیک نسبت به آلرژن ها با احتیاط مصرف گردد. • مصرف این دارو در افراد با سابقه ی نقرس، وجود استعداد فامیلی یرقان و یا نارسایی مزمن کلیه میتواند باعث تسریع بروز نقرس شود که این احتمال با دوزهای بالاتر از ۲۵ میلی گرم افزایش می یابد. • در افراد با اختلال عملکرد کلیه با احتیاط مصرف گردد و در صورت پیشرونده شدن اختلال عملکرد کلیه باید مصرف دارو قطع گردد. • احتمال بروز اختلالات الکترولیت (هایپوکالمی، آلکالوزهایپوکلرمی، هایپومگنزمی، هایپوناترمی) با این دارو وجوددارد لذا توصیه میشود قبل از شروع دارو اختلالات الکترولیت اصلاح گردد. • با مصرف این دارو احتمال بروز عوارض چشمی (حساسیت به نور، گلوکوم زاویه بسته ی حاد و نزدیک بینی ناپایدار) خصوصاً در ابتدای مصرف وجود دارد که در صورت بروز درد در چشم و یا کاهش حاد در بینایی ، مصرف دارو باید فوراً قطع گردد. • در افراد مبتلا به اختلال تنگی مجاری تنفسی باید مصرف دارو با احتیاط و تحت نظر پزشک انجام گردد . • در افراد دیابتی با احتیاط مصرف گردد زیرا این دارو میتواند باعث مخفی نمودن علائم افت قند خون شود. • در افراد با سابقه ی اختلالات روانی با احتیاط مصرف گردد زیرا این دارو میتواند باعث کاهش فعالیت سیستم اعصاب مرکزی گردد. • در افراد مبتلا به پرکاری تیرویید با احتیاط مصرف گردد زیرا این دارو میتواند علائم پرکاری تیروئید (تاکی کاردی) را مخفی نماید و قطع ناگهانی آن باعث تشدید طوفان تیرویدی گردد. • در افراد مبتلا به نارسایی قلبی جبران شده با احتیاط مصرف گردد و در طول مصرف دارو شرایط بیمار تحت نظر پزشک ارزیابی گردد و به محض مشاهده اولین علائم نارسایی قلبی مصرف دارو قطع گردد. • در افراد با اختلال عملکرد کبدی یا بیماریهای کبدی پیشرونده با احتیاط مصرف گردد. قطع مصرف این دارو در مبتلایان به سیروز کبدی باید به آهستگی انجام گیرد. • در افراد مبتلا به انسداد عروق محیطی و یا سندروم رینود با احتیاط مصرف گردد. بیمار باید در طول درمان از لحاظ پیشرفت انسداد شریانی بطور مداوم ارزیابی گردد. • مصرف این دارو میتواند باعث بروز حساسیت به نور در پوست، فعال کردن و یا تشدید لوپوس اریتماتوز سیستمیک گردد لذا توصیه می شود در صورت بروز هرگونه تغییر در سطح پوست خود به پزشک متخصص پوست مراجعه نمایید. همچنین در طول مصرف دارو از کرم های ضد آفتاب استفاده نمایید. • در افراد مبتلا به آنژین پرینزمتال، افراد دارای غلظت کلسترول متوسط تا بالا، میاستنی گراو، فئوکروماسیتوم با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف گردد. • مصرف این دارو پیش از انجام تست عملکرد پاراتیروئید باید قطع گردد. • از مصرف همزمان با سایر داروهای بتابلاکر(متوپرولول، آتنولول، پروپرانولول، کارودیلول) اجتناب نمایید. • از قطع مصرف ناگهانی و بدون توصیه ی پزشک خودداری نمایید. جهت جلوگیری از بروز عوارض قلبی، قطع مصرف دارو باید به صورت تدریجی و در طی مدت زمان حداقل یک هفته انجام شود. • مصرف مداوم این دارو نباید پیش از جراحی های بزرگ قطع گردد. • پارامترهایی که باید در طی مصرف این دارو مورد ارزیابی قرار گیرند: فشار خون، ضربان قلب، تعادل الکترولیتی بدن، عملکرد کلیوی و سطح سرمی گلوکز (قندخون) که باید به صورت دوره ای در افراد دیابتی کنترل گردد.

شرکت داروسازی رهـا RAHA Pharma. Co.
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز،شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+) www.rahapharm.com

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی بدین صورت است:

دوز معمول اولیه با ۲/۵ میلی گرم بیزوپرولول/ ۶/۲۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید در روز (صبح ها) شروع می شود و در صورت نیاز افزایش می یابد. حداکثر دوز مصرفی در روز ۲۰ میلی گرم بیزوپرولول / ۱۲/۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید می باشد.

خط شکست قرص فقط جهت تسهیل شکستن به منظور بلع آسان تر قرص است و با آن خط نمی توان قرص را به دوز های متناسب تقسیم کرد.

در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، نوبت فراموش شده را مصرف نکنید و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

بارداری: این دارو در رده c بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد، لذا مصرف آن در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که نیاز به آن توسط پزشک کاملاً محرز شده باشد و فواید حاصله به طور کامل بر زیان احتمالی آن روی جنین برتری داشته باشد.

شیردهی: با توجه به اینکه این دارو در شیر مادر وارد میشود و میتواند باعث بروز عوارض جانبی در نوزاد گردد لذا مصرف آن در دوران شیردهی، مگر در صورت صلاحدید پزشک متخصص براساس منافع بیمار توصیه نمیگردد.

عوارض جانبی: هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته ای نیز بشود. گرچه همه ی این عوارض در یک فرد اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر کدام از آنها با پزشک خود مشورت نمایید: هایپراوریسمی (انباشته شدن اسید اوریک در خون)، هایپوکالمی، سردرد، سرگیجه، احساس خستگی شدید و اسهال.

موارد منع مصرف: سابقه ی حساسیت به این دارو یا سایر سولفونامیدها، بلوک دهلیزی بطنی درجه ۲ یا ۳، برادیکاردی سینوسی، شوک کاردیوژنیک، نارسایی قلبی آشکار، هایپرکلسمی، بی ادراری.

تداخلات: قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید به پزشک خود اطلاع دهید: سایر داروهای کاهنده ی فشار خون، گوانتیدین، رزرپین، داروهای ضدآریتمی (آمیودارون)، وراپامیل، دیلتیازم.

سایر تداخلات: توپیرامات، گلیکوزیدهای دیجیتالیس، ریفامپین، اپی نفرین

• مصرف همزمان با الکل، باربیتورات ها و داروهای خواب آور باعث تشدید افت فشار وضعیتی در بیمار میگردد. • در صورت مصرف همزمان باید داروهای ضددیابت (خوراکی و انسولین) تنظیم دوز گردند. • بروز اختلال در جذب در صورت مصرف همزمان با کلستیرآمین و رزین های کولستیپول. • تشدید تخلیه الکترولیت ها و احتمال بروز هایپوکالمی در صورت مصرف همزمان با کورتیکواستروییدها و هورمون های آدرنوکورتیکوتروپیک. • احتمال کاهش پاسخ به آمین های بالابرنده فشار خون مانند نوراپی نفرین. • احتمال افزایش پاسخ به توبوکورارین. • ضد التهاب های غیراستروییدی (ایبوپروفن، دیکلوفناک، ملوکسیکام، پیروکسیکام) باعث کاهش اثر کاهندگی فشارخون.

• به علت افزایش ریسک بروز مسمومیت با لیتیوم، از مصرف همزمان با لیتیوم خودداری نمایید.

تداخلات رده X (منع مصرف مطلق): آمیـنولوولینیک اسید، برمپریدول، سریتینیب، دوفتیلید، فلوکتافنین، لووسولپیراید، مکامیلامین، متاکولین، پرومازین، ریواستیگمین.

مسمومیت: در صورت مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک، فوراً به بیمارستان مراجعه کنید. نشانه های مسمومیت با این دارو عبارتند از افت شدید فشار خون، ضربان کند، مشکلات قلبی، مشکل در هدایت الکتریکی قلب، تنگی نفس، آبی شدن پوست، افت قند خون، هایپوکالمی، بیهوشی و کما.

شرایط نگهداری: دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

بسته بندی: شرکت داروسازی رها پروفام اچ®را به صورت قرص روکشدار خط دار، داخل بلیستر و درون جعبه عرضه می نماید.

TAB.LFT.PRFH2.5, 5,10/116.03

شرکت داروسازی رهـا RAHA Pharma. Co.
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز،شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۹۸+) www.rahapharm.com