شـــرکت داروسازی ر هـــا
RAHA Pharmaceutical Co.

تگاتارد®

کاربامازپین

Tegatard®

Carbamazepine

شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی (۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر)
دسته درمانی : ضد تشنج، ضد دردهای نوروپاتی

موارد مصرف و آثار درمانی :

درمان صرع پارشیال، صرع تونیک کلونیک (grand mal)، ترکیبی از انواع تشنج (mixed seizure patterns)، نورالژی عصب ۳ قلو و دردهای مرتبط با آن، درمان دوره های حاد مانیک و مختلط مرتبط با اختلال دو قطبی نوع ۱

راهنمایی‌های عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمائید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

۱- در صورت حساسیت به این دارو یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن
۲- در صورت حساسیت به فنی توئین، فنوباربیتال، پریمیدون، اکس کاربازپین
۳- در صورت سابقه انواع دیگر صرع (ابسنس و آتونیک)
۴- در صورت سابقه افزایش فشار چشم (گلوکوم)
۵- در صورت سابقه اختلالات کلیوی و کبدی، رفتاری و ذهنی، افکار خودکشی یا MS
۶- در صورت سابقه اختلالات خونی و اختلال قلبی و یا کبدی در اثر مصرف داروهای دیگر
۷- در صورت سابقه ژنتیکی وجود یا عدم وجود HLA-B1502

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

این دارو در رده D بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد. درصورت نیاز به مصرف، فواید و مضرات دارو باید توسط پزشک بررسی و مقایسه گردد. کاربامازپین در شیر نیز ترشح می شود.

هشدارها :

۱- جهت ادامه درمان و تغییر دوز دارو، حتما با پزشک خود مشورت نمایید.
۲- از قطع ناگهانی و کاهش دوز دارو خودداری کنید.
۳- از رانندگی و کارهائی که نیازمند هوشیاری کامل است تا رفع اثر دارو و کنترل قطعی اجتناب نمایید.
۴- از نوشیدن الکل و سایر نوشیدنی ها و داروهای الکل دار و سایر داروهای ساپرس کننده مغز و اعصاب اجتناب کنید.

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۰۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۰۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com

(Page 1)

شـــرکت داروسازی ر هـــا
RAHA Pharmaceutical Co.

۵- در طول مدت مصرف این دارو، آب گریپ فروت ننوشید.
۶- در صورت فراموشی یک دوز دارو، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.
۷- از مصرف دارو در نوزادان کمتر از یک ماه خودداری گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

میزان مصرف این دارو را پزشک معالج تعیین می کند. در صورت امکان، دوز مصرفی روزانه در ۳ یا ۴ دوز منقسم استفاده گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود، گرچه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز به پزشک مراجعه کنید.
دو بینی، نیستاگموس، واکنش های آلرژیک، سندرم استیون جانسون، راش، خارش، اضطراب، آتاکسی، اسهال، عوارض اکسترا پیرامیدال، درد قفسه سینه، هیپوناترمی، SIADH(water intoxication)، سر درد و به صورت نادر آدنوپاتی، لنفادنوپاتی، مشکلات کلیوی، لکوپنی، پان سیتوپنی، ترومبوسیتوپنی، آگرانولوسیتوز و ائوزینوفیلی که همگی با علائم تب و شاید گلو درد، خون دماغ، خستگی و... نمایان شوند.

مسمومیت دارویی :

در صورت مصرف دارو بیش از مقدار تجویز شده، به بیمارستان مراجعه کنید.

تداخلات دارویی :

- قبل از مصرف دارو، پزشک یا داروساز خود را از مصرف هرگونه دارو مطلع سازید.
- بسیاری از داروها با مصرف کاربامازپین دچار کاهش یا افزایش غلظت پلاسمایی می شوند.
- از مصرف چای کوهی اجتناب شود.
- در لیست زیر به اختصار نام برخی از داروها که تداخل ایجاد میکنند، آورده شده است:
  تئوفیلین، داروهای ضد بارداری و داروهای هورمونی، برخی آنتی بیوتیک ها(ماکرولیدها)، داروهای ضد قارچ (فلوکونازول وکتوکونازول)، داروهای ضد سرطان (سیس پلاتین)، داروهای ضد فشارخون از جمله دیلتیازم، داروهای استروئیدی (دگزامتازون و پردنیزولون)، لووتیروکسین، تاکرولیموس، سیکلوسپورین، وارفارین.
- برای اطلاع دقیق از نوع تداخل و شدت تداخل با پزشک مشورت نمایید. در برخی موارد با تنظیم دوز و صلاحدید پزشک معالج، مصرف همزمان مشکلی ندارد.

شرایط نگهداری دارو :

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها کاربامازپین را با نام تجاری تگاتارد®، به صورت سوسپانسیون خوراکی با حجم ۲۵۰ میلی‌لیتر، درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه میکند.

SYR.LFT.TGT100/014.04

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۰۳۱(۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۰۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com

(Page 2)