



عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. گر چه همه این عوارض در یک فرد رخ نمی دهد ولی در صورت بروز هر یک از این عوارض به پزشک اطلاع دهید:
واکنش های حساسیتی مانند آنافیلاکسی، تشنج، اختلال بینایی، ضعف و افت فشار، آمبولی ورید یا سرخگ، اسهال، تهوع و استفراغ، آلرژی درماتیت، انسداد عروق شبکیه، آمبولی ریوی و ایجاد لخته خون در مفر.

مقدار و نحوه مصرف:

مصرف این دارو باید طبق تجویز پزشک صورت گیرد. اما معمولاً به صورت ۱ گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت در خونریزی عمومی و ۵/۵ تا ۱ گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت در خونریزی موضعی، به صورت تزریق وریدی آهسته با سرعت ۱ میلی لیتر در دقیقه تجویز می گردد.
بطور کلی لودینگ دوزهای ترانگزامیک اسید در ۵ تا ۲۵ میلی لیتر محلول تزریقی دگستروز ۵ درصد یا سدیم کلراید ۰/۹ درصد، طی مدت ۵ تا ۳۰ دقیقه تجویز می شود.
این دارو نباید در ترکیب با محلول های حاوی پنی سیلین تزریق گردد.

تداخلات دارویی:

چنانچه از دارو های زیر استفاده می نمائید، پیش از مصرف این دارو به پزشک خود اطلاع دهید:
داروهای ضد انعقاد، داروهای هموستاتیک، داروهای آنتی فیبرینولیتیک، داروهای جلوگیری از بارداری خوراکی و داروهای حاوی استروژن.

مسمومیت:

علائم مسمومیت با این دارو شامل خواب آلودگی، سردرد، افت فشار خون و تشنج می باشد. تشنج به دنبال مصرف مکرر با دوز بالا اتفاق می افتد. علائم مسمومیت باید به صورت حمایتی درمان گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به ترانگزامیک اسید یا هر یک از اجزاء فرمولاسیون دارو

- وجود لخته فعال در عروق
- سابقه تشنج
- نارسایی شدید کلیوی
- هرگونه شرایط خونریزی دهنده
- اختلال در دیدن رنگ ها
- خونریزی تحت عنکبوتیه (به دلیل افزایش احتمال بروز ادم مغزی، سکته مغزی و تشنج).

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها آمپول ترانگزامیک اسید را در پوکه های ۵ میلی لیتری و جعبه های مقوایی ۵ عددی به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.



ترانگزامیک اسید ۵۰۰

Tranexamic Acid 500

ترکیبات: ترانگزامیک اسید ۵۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

شکل دارویی: آمپول ۵ میلی لیتری

دسته درمانی: ضد خونریزی

موارد مصرف:

- پیشگیری و درمان خونریزی های ناشی از فیبرینولیز عمومی یا موضعی در بزرگسالان و کودکان بالای یک سال
- کنترل خونریزی در شرایطی مانند خونریزی شدید قاعدگی، خونریزی رحم، خونریزی گوارشی و خونریزی مجاری ادراری
- پیشگیری و درمان خونریزی در اعمال جراحی گوش و حلق و بینی (از جمله کشیدن دندان و خارج کردن لوزه ها)
- کنترل و پیشگیری از خونریزی در اعمال جراحی زنان، جراحی های شکم و قفسه سینه، جراحی قلب و عروق
- کنترل خونریزی به علت مصرف داروهای فیبرینولیتیک
- کنترل خونریزی تحت جمجمه
- آنژیوادم وراثتی

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز مشورت نمایید:

سابقه حساسیت به این دارو، مصرف هر گونه داروی دیگر، ابتلاء به بیماری های دیگر و بارداری یا شیردهی.

هشدارها:

- مصرف این دارو باید به صورت تزریق وریدی آهسته یا انفوزیون وریدی آهسته (حداکثر با سرعت ۱ میلی لیتر در دقیقه) صورت گیرد و از تزریق داخل عضلانی خودداری گردد.
- مواردی از تشنج پس از تزریق این دارو در دوزهای بالا گزارش شده است.
- در صورت رخداد اختلال بینایی مانند تاری دید و اختلال در دیدن رنگ ها، باید مصرف دارو قطع گردد. در صورتی که نیاز به مصرف طولانی مدت این دارو به صورت تزریق باشد، حتماً باید بیمار از نظر بینایی مرتباً ارزیابی گردد.
- در صورت بروز خونریزی از قسمت های فوقانی دستگاه ادراری، احتمال انسداد مجاری وجود دارد.
- پیش از مصرف این دارو، باید ریسک فاکتور های انعقادی بررسی شوند. در صورتی که بیمار سابقه شخصی یا خانوادگی حوادث ترومبوآمبولیک داشته باشد، محلول تزریقی ترانگزامیک اسید باید با احتیاط تجویز گردد.
- ترانگزامیک اسید در افرادی که از داروهای خوراکی جلوگیری از بارداری استفاده می کنند باید با احتیاط مصرف گردد.
- هر آمپول برای یکبار مصرف است و باقی مانده دارو را پس از مصرف دور بریزید.
- مصرف این دارو در افرادی که دچار انعقاد منتشر داخل عروقی (Disseminated intravascular coagulation) هستند، توصیه نمی گردد.
- در شرایط نارسایی کلیه لازم است دوز دارو تنظیم گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

ترانگزامیک اسید در رده B بارداری از طبقه بندی FDA قرار دارد.

مصرف در دوران بارداری در صورتی مجاز است که نیاز به آن توسط پزشک کاملاً محرز شده باشد.

این دارو در شیر ترشح می گردد، لذا مصرف در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.