

بریمونیدین ۰/۲ درصد / تیمولول ۰/۵ درصد

دسته دارویی: ضد گلوکوم

هشدارها و موارد احتیاط: ● این دارو در مبتلایان به بیماری آسم یا سابقه ابتلا به آن، بیماری انسدادی مزمن و شدید ریه، ناراحتی قلب، شوک یا منشأ قلبی، بلوک دهلیزی - بطنی درجه ۳ و کنترل نشده توسط پمپ میکر، اختلالات عروقی حیاتی مانند سندرم رنود و برادری کاردی سینوسی منع مصرف دارد. ● این دارو در بیماران دیابتی یا افرادی که احتمال دارد هایپوگلاسمی درآنها وجود دارد، باید با احتیاط مصرف گردد. ● احتمال ضعف عضلانی به خصوص در افرادی با علائم میاستنیک، پس از مصرف این دارو افزایش می یابد. ● این دارو می تواند علائم هایپرتریپتوزیوم مانند تآکسی کاردی را بهبودانند، لذا در افرادی که احتمال بروز تیروتوکسیکوز در آنها وجود دارد با احتیاط مصرف شود و بیمار تحت پایش قرار گیرد. ● این دارو در افرادی که مبتلا به بیماری های قریبه هستند، باید با احتیاط مصرف شود. ● احتمال بروز واکنش های آلرژیک به خصوص در افرادی که سابقه آتوپی یا آلرژی به موارد زیادی مانند آدنالن-دین، پس از مصرف این دارو وجود دارد. ● استفاده همزمان این دارو با سایر بتابلاکرها (حتی موضعی) توصیه نمی گردد. ● قبل از انجام هرگونه بی هوشی و بی حس، پزشک را از مصرف این دارو مطلع کنید. ● به علت وجود بتاگونوم کلراید در این محصول بهتر است، همزمان با نژهای تماسی نرم استفاده نشود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی: در دوران بارداری در صورت صلاحدید پزشک مصرف گردد. تیمولول در شیر مادر ترشح می گردد لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو: مقدار مصرف را پزشک معالج تعیین میکند. دستور مصرف معمول دارو به صورت زیر می باشد: روزی دو مرتبه، تقریباً هر ۱۲ ساعت یک بار و هر بار یک قطره در روز چشم بچکانید. در صورتی که نیاز به مصرف داروی چشم دیگری باشد، با ۵ دقیقه فاصله استفاده شود. برای مصرف دارو سر را از بالا به سمت عقب کشید، خم کنید، پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید (شکل ۱). یک قطره از محلول را در حفره بین پایین بچکانید (شکل ۲). در حالی که چشم پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل ۳). به مدت ۵-۳ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت به سمت بیرون فشار دهید.

(4) **عوارض جانبی:** هر رازو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است در بعضی افراد موجب بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شوند، ولی در صورت بروز هر یک از آنها بهتر است با پزشک مشورت شود. **عوارض با شیوع بیشتر:** احساس سوزش، قرمزی، کوژنوتیکولیاز، زخم، قرینه، احساس جسم خارجی در چشم، کوژنوتیکسیتوز آلرژیک، خارش، التهاب بکله، خشکی چشم، ابریزش، درد و ناراحتی در چشم، اختلال بینایی، بیخوابی، سردرد، افسردگی، افزایش فشارخون، خشکی دهان. **عوارض با شیوع کمتر:** واکنش های آلرژیک، گیجی، سندرم رینیت خشکی بینی، اسهال، یبوست، دوپینی، افت فشار خون، میوز، زردی، سستی در تنفس، هایپوگلیسمی، درد قفسه

تداخلات دارویی: مصرف همزمان با داروهای بلاک کننده کانال کلسیمی، بلاک کننده های گیرنده آدرنوزیک، ناروهای آنتی آرتیمی (شامل آمودورون)، گلیکوزیدهای دیجیتال، پاراسیتامیتیک ها، گوانتینیدین احتمال افت فشار خون و برای کاردی از افزایش می دهد. احتمال مہار سیستمیک گیرنده های بتا را افزایش می دهد. مصرف همزمان با داروهای کلونیدین، داروهای بی حسی و میویشی، سابتینیدین، هیدرالازین، فنوتیازین و الکل تداخل دارد. مصرف همزمان با سایر نیازکراهی چشمی و ایی نفرین باعث ایجاد میرداری می گردد. مصرف همزمان بریمونیدین/ تیمولول با محصولات حاجب پیدار و لیدوکائین باید با احتیاط صورت گیرد. مصرف همزمان بریمونیدین با داروهای MAOI و داروهای فاسفردسگی با اثر نورآدرنوزیک ترنسمیثن مانند سه حلقه ای ها ممنوعیت دارد. بیوستی حاصل از روز؛ از زمان قطع این دارو گذشتہ باشد تا بتوان درمان بریمونیدین/ تیمولول را شروع کرد.

شرایط نگهداری: دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. یک ماه پس از باز شدن دربوش ظرف برای اولین بار، باقیمانده را دور بریزید.

پیسته بندی: شرکت داروسازی رها قطره چشمی تیمولین-بی[®] را در ظروف پلی اتیلنی بسته بندی می نماید.